

## FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Bepanthe Plus 50 mg/g + 5 mg/g Creme  
Dexpantenol + Cloridrato de cloro-hexidina

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Bepanthe Plus com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Bepanthe Plus e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Bepanthe Plus
3. Como utilizar Bepanthe Plus
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Bepanthe Plus
6. Outras informações

### 1. O QUE É BEPANTHENE PLUS E PARA QUE É UTILIZADO

Bepanthe Plus está indicado no tratamento de feridas (cortes, arranhões, escoriações, rágadas e ulcerações) e queimaduras superficiais quando existe algum risco de infecção.

### 2. ANTES DE UTILIZAR BEPANTHENE PLUS

Não utilize Bepanthe Plus

- se tem alergia (hipersensibilidade) ao dexpantenol, à cloro-hexidina ou a qualquer outro componente de Bepanthe Plus.
- em feridas graves, profundas ou muito sujas. Estas feridas devem ser tratadas pelo médico.

Tome especial cuidado com Bepanthe Plus

- Evite o contacto do creme com os olhos e as mucosas.

Bepanthe Plus não deve ser utilizado em feridas ou irritações de pele que não apresentem risco de infecção (por exemplo queimaduras solares). Nestes casos, recomenda-se o Bepanthe creme que é uma formulação aquosa, fácil de espalhar e de penetração rápida, também adequada para cuidar de feridas húmidas, zonas pilosas e zonas de pele mais expostas (como a face, os cotovelos e as mãos).

Quando seja conveniente existir uma barreira protectora (por exemplo na prevenção e tratamento do eritema da fralda do bebé e do peito da mãe que amamenta) ou se a pele é muito seca, recomenda-se o Bepanthene pomada que tem um elevado teor de gordura.

Sendo o Bepanthene Plus para utilização em períodos de curta duração, se verificar agravamento e/ou atraso na cicatrização deverá consultar o médico.

Ao utilizar Bepanthene Plus com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Bepanthene Plus não deve ser usado simultaneamente com sabões, outros anti-sépticos ou desinfectantes

Ao utilizar Bepanthene Plus com alimentos e bebidas

Não aplicável.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Bepanthene Plus pode ser utilizado durante a gravidez e o aleitamento, no entanto, não deve ser utilizado sobre grandes extensões de pele.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não relevante.

Informações importantes sobre alguns componentes de Bepanthene Plus

O álcool cetílico, o álcool estearílico e a lanolina podem causar reacções cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto).

### 3. COMO UTILIZAR BEPANTHENE PLUS

Limpe a ferida ou a zona da pele infectada o melhor possível e aplique uma fina camada de Bepanthene Plus. Se necessário, pode cobrir a ferida com um penso adesivo ou gaze. Aplique o Bepanthene Plus várias vezes ao dia até à cicatrização das feridas.

Se utilizar mais Bepanthene Plus do que deveria

O dexpanthenol é bem tolerado mesmo em doses elevadas e não é considerado tóxico na literatura científica. Não se conhece hipervitaminose.

Caso se tenha esquecido de utilizar Bepanthene Plus

Não relevante.

Se parar de utilizar Bepanthene Plus

Não relevante.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### 4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Bepanthene Plus pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Podem ocorrer alterações do sistema imunitário e da pele: reacções alérgicas e reacções alérgicas da pele tais como dermatite de contacto, dermatite alérgica, comichão, vermelhidão da pele (eritema), formação de bolhas com comichão (eczema), aparecimento de borbulhas (rash), urticária, irritação da pele e formação de bolhas com líquido (flictenas).

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

#### 5. COMO CONSERVAR BEPANTHENE PLUS

Não conservar acima de 25°C.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Bepanthene Plus após o prazo de validade impresso na embalagem. após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente

#### 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Bepanthene Plus

As substâncias activas são o dexpanthenol (50 mg/g) e o cloridrato de cloro-hexidina (5 mg/g).

Os outros componentes são DL-pantolactona, álcool cetílico, álcool estearílico, vaselina branca, parafina líquida, lanolina, estearato de macrogol, água purificada.

Qual o aspecto de Bepanthene Plus e conteúdo da embalagem

Bepanthene Plus apresenta-se como um creme homogéneo, opaco, branco ou branco - amarelo pálido.

Bisnagas em alumínio com tampa em polipropileno com 30 g de creme.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Bayer Portugal, Lda.  
Rua Quinta do Pinheiro, 5  
2794-003 Carnaxide  
Portugal

Fabricante

GP Grenzach Produktions GmbH  
Emil-Barrell- Strasse 7,  
D-793639 Grenzach - Wyhlen  
Alemanha

Este folheto foi aprovado pela última vez em 05/2016.